

外国人新冠病毒预防疫苗接种指南

新冠疫苗接种前后注意事项

接种前	接种后
<ul style="list-style-type: none">▲健康状况良好时接种▲接种前必须接受医生预诊▲有下列情况延期接种<ul style="list-style-type: none">.疑似感染新冠的, 延期接种.隔离中的新冠患者或接触者, 延期接种.发热(37.5°C 以上)等有急性病的, 延期接种	<ul style="list-style-type: none">▲接种后在接种机构停留15-30分钟, 观察有无异常反应发生, 后3个小时注意观察▲接种后一周避免高强度运动及活动▲保持接种部位清洁

接种新冠疫苗后可能发生的异常反应

- ▲接种后会发生接种部位疼痛, 浮肿, 红肿, 发热, 疲劳感, 头痛, 肌肉痛, 发冷, 恶心等症
- ▲会出现呼吸困难, 脸部浮肿, 眼睛或口部口腔浮肿等严重的过敏症状
- ▲辉瑞, 摩德纳疫苗接种后, 会出现胸口疼痛, 压迫感, 不舒服, 呼吸困难或喘气呼吸时疼痛, 心跳过快, 悸动, 昏迷等症状, 会发生心肌炎, 心包炎症状

新冠疫苗接种后异常反应发生情况

- ▲接种部位浮肿, 疼痛的, 用干净的干毛巾在上面冷敷
- ▲有微热的情况, 充分的摄取水分, 休息

▲因发热或肌肉疼痛不舒服的，服用解热镇痛剂

.接种前准备有乙酰氨基苯成分的解热镇痛剂，接种后出现浑身难受的症状情况服用解热镇痛剂

▲出现以下症状请接受医生诊疗

.胸痛，压迫感，不舒服，呼吸困难或喘气呼吸时疼痛，心跳过快，悸动，昏厥等症状新发生或持

续恶化的情况

.接种部位疼痛，浮肿，红肿或发热等2天不见好转或恶化的情况

.新冠疫苗接种后突然疲惫或与平时比出现其他异常症状的时候

▲呼吸困难或严重的头晕的，嘴部脸部浮肿，全身严重麻疹的症状出现的情况，联系119

或来医院急救室

疑似异常反应发生的情况，请垂询1339或辖区的保健所，或预防接种帮扶世家 (<http://ncv.kdca.go.kr>) 在 '예

방접종 후 건강상태 확인하기'可确认异常反应和应对方法